


Sudha Nahar, M.D.

Ritu Nahar, M.D.



GYAN GASTROENTEROLOGY LLC
A DIVISION OF ALLIED DIGESTIVE HEALTH LLC

Professional Center at Somerset
17 Clyde Road, Suite 101
Somerset, NJ 08873
Tel: (732) 873-1600

Durham Center
1 Ethel Road, Suite 106A
Edison, NJ 08817
Fax: (732) 548-7408

Instrucciones De Colonoscopia

FECHA DE PROCEDIMIENTO _____

HORA: El centro le llamara el día antes de su colonoscopia con su **Hora de Llegada**

Centro: Specialty Surgical Center of North Brunswick (732)422-9900
Website: NorthBrunswickSurgicalCenter.com
1520 US Route 130, Suite 102, North Brunswick, NJ 08902

***Su receta es mandada electrónicamente a su farmacia. Favor de recogerla en la farmacia.**

Semana antes de la Colonoscopia:

Por favor parar todo Diluyente de Sangre (**Plavix, Coumadin, ect.**) 7 días antes de su colonoscopia. Por favor consulte con su doctor primero, si no lo ha hecho ya. Tylenol o acetaminophen no tiene que ser descontinuado.

Medicamentos para la perdida de peso (**Ozempic, Mounjaro etc.**) deben de ser parados 7 días antes de su procedimiento.

Día antes la Colonoscopia:

1. **Pacientes Diabético:** debería solo tomar media dosis de su medicamento.
2. Todas las comidas deben **consistir en líquidos claros del desayuno a medianoche**. líquidos claros incluye Agua, Jugo de Fruta Claro (**no jugo rojo**), Limonada (**sin pulpa**), Gatorade (**nada rojo o naranja**), Soda (**nada rojo o naranja**), Jell-O (**solo verde o amarillo**), Caldo- pollo, res, verdura (**Debe ser claro**), Paletas de hielo (**nada rojo o naranja, sin frutas o leche**), Café o Te (**NO leche o crema**).
3. No debe tomar ni comer nada después de medianoche. Lo único permitido es la preparación indicada abajo.

Preparaciones:

Golytely, Colyte, etc.

- 1. Tomar la mitad de la preparación a las 6PM, después tomar la otra mitad **CINCO HORAS** antes de la **HORA DE LLEGADA**.

Clenpiq:

- 1. A las 5PM tomar una botella de Clenpiq, seguida por 5 vasos (8 onzas cada uno) de agua.
- 2. **CINCO HORAS** antes de su **HORA DE LLEGADA** tomar la segunda botella de Clenpiq, seguida por 4 vasos (8 onzas cada uno) de agua.

Suprep:

- 1. A las 6 PM vaciar una botella en el vaso incluido.
- 2. Agregue agua a la línea de 16 onzas y tomar todo el líquido del vaso.
- 3. Debe tomar 2 vasos más de 16 onzas de agua durante la siguiente hora.
- 4. **CINCO HORAS** antes de la **HORA DE LLEGADA** vaciar la segunda botella al vaso incluido.
- 5. Agregue agua a la línea de 16 onzas y tomar todo el líquido del vaso.
- 6. Debe tomar 2 vasos más de 16 onzas de agua durante las siguiente 3 horas.

No coma o tome el día de su procedimiento con excepción de la preparación detallada arriba.

TOME SU MEDICAMENTO DE LA PRESSION ANTES DE LAS 7AM CON TRAGITOS DE AGUA.

Debe traer a alguien que lo pueda llevar de regreso a su casa, ya que recibirá anestesia. No debería manejar 24 horas después de que su examen sea completo.

Si tiene alguna pregunta por favor llame mi oficina al (732)-873-1600.

Tiempo de Llegada	Segunda Dosis
6:30 AM	1:30 AM
7:00 AM	2:00 AM
7:30 AM	2:30 AM
8:00 AM	3:00 AM
8:30 AM	3:30 AM
9:00 AM	4:00 AM
9:30 AM	4:30 AM
10:00 AM	5:00 AM
10:30 AM	5:30 AM
11:00 AM	6:00 AM
11:30 AM	6:30 AM
12:00 PM	7:00 AM